

Medicina Veterinária

LIPOMA SUBCUTÂNEO ABRANGENDO AS REGIÕES TORÁCICA E ABDOMINAL DE UM CANINO: RELATO DE CASO

Gabriela Maria de Almeida Viana - 5º módulo de Medicina Veterinária, DMV/UFLA

Tuane Ferreira Melo - Doutoranda em Ciências Veterinárias, DMV/UFLA

Rafaella Silva Andrade - Doutoranda em Ciências Veterinárias, DMV/UFLA

Josiane Aparecida Martiniano de Pádua - Mestranda em Ciências Veterinárias, DMV/UFLA

Marina Martins de Oliveira - Doutoranda em Ciências Veterinárias, DMV/UFLA

Ana Paula Peconick - Professora Associada de Imunologia, DMV/UFLA - Orientador(a)

Resumo

As neoplasias cutâneas são as mais frequentemente encontradas e diagnosticadas em animais na rotina de clínicas e hospitais veterinários, representando cerca de 30% dos tumores em cães. O lipoma, no entanto, é um tumor mesenquimal benigno, formado pelo acúmulo de células de gordura e ocorre, principalmente, no tronco, nas porções proximais das extremidades do corpo e na região de cabeça e pescoço, com incidência de 15 a 20% dos casos. O seu diagnóstico é realizado por meio da observação dos sinais clínicos e exames complementares (hemograma, bioquímica sérica, exames de imagem, e exames de cito e histopatológico). O tratamento cirúrgico por meio da excisão tumoral é um tratamento de eleição, podendo ser associada com radioterapia adjuvante, caso a excisão seja incompleta. O referido trabalho tem como objetivo relatar o caso clínico de um canino, macho, raça Labrador, 7 anos, com histórico de aumento de volume em região torácica/abdominal há uma semana. No exame físico, notou-se nódulo em região do esterno, medindo aproximadamente 5 cm, de aspecto macio e regular. Nos exames laboratoriais (hemograma, perfil renal e hepático e proteínas totais) não apresentou nenhuma alteração e realizou-se também a citologia por agulha fina do nódulo. Na análise citológica diagnosticou-se lipoma. Como deve considerar como diagnóstico diferencial ao tecido adiposo normal obtido por punção do panículo de tecido adiposo subcutâneo recomenda-se fazer uma análise histopatológica, no presente relato não foi realizado por opção do tutor. Além disso, pode ocorrer o crescimento do nódulo. Dessa forma, foi indicado ao tutor do paciente, a retirada do nódulo. Contudo o tutor optou por observar o nódulo e se for identificado o aumento rápido de tamanho, comprometeu-se em trazer para retirada. O tratamento por meio da excisão cirúrgica tem resultados satisfatórios e na maioria dos casos não necessitando de quimioterapia adjuvante.

Palavras-Chave: Cirurgia, Tumor, Neoplasia cutânea.

Instituição de Fomento: Universidade Federal de Lavras

Link do pitch: <https://youtu.be/IWfROMhrn04>